



Quizz initial

- A Genève, la prévalence du VIH est égale à celle du Sénégal : V/F ?
- Comme aux USA, en CH le test VIH est obligatoire pour les étrangers pour un séjour >3 mois : V/F ?
- Quand avez-vous fait un test HIV à un patient, pour la dernière fois ?
- Si le test était négatif, qu'avez-vous fait ?
- Quand avez-vous parlé prévention HIV avec un patient pour la dernière fois ?



HIV prevalence (%) in adults (15-49) in Africa, 2007




Prévalence de l'HIV en CH : 0.6 % (0.3 à 1.0%)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de données Santé publique
Division Maladies transmissibles

OFSP 2010



Diagnosics du VIH (extrapolés) selon l'année du test, la voie d'infection ^a et la région d'origine ^a											
Voie d'infection	Région d'origine	Année du test									
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (au 31.12.2009)
Rapports hétérosexuels	Suisse	151	142	153	155	169	128	133	109	119	106
	Europe	29	24	36	39	34	47	29	33	39	18
	Subsahara	116	136	162	178	179	143	136	146	106	88
	Autres	31	49	61	64	65	58	62	64	91	65
Rapports homosexuels	Suisse	101	109	146	102	122	150	184	195	209	138
	Europe	24	13	25	31	27	46	59	55	47	44
	Subsahara	1	3	1	6	2	2	2	0	2	5
	Autres	22	17	21	20	23	41	44	60	76	54
Injection de drogues	Suisse	62	68	56	83	55	46	43	41	15	17
	Europe	16	12	25	26	16	11	5	11	11	9
	Subsahara	1	4	7	1	4	9	1	1	0	4
	Autres	0	12	4	9	9	11	11	6	5	1
Autres	Suisse	7	23	28	16	16	9	21	8	21	13
	Europe	3	3	6	2	3	3	3	5	6	5
	Subsahara	11	12	30	20	17	11	14	16	15	11
	Autres	3	5	13	5	2	7	15	15	13	11



En 2002, on a surtout constaté une augmentation des tests positifs chez les hétérosexuels venant d'Afrique sub-saharienne et chez les hommes ayant des rapports homosexuels (HSH) d'origine suisse et européenne. La tendance est décroissante dans le premier groupe depuis 2008 et le nombre de cas enregistrés en 2009 était inférieur à celui de l'an 2005. Chez les HSH, le nombre de cas en 2009 était inférieur à celui de l'an 2005.

Répartition des tests VIH positifs, des cas de sida et des décès par canton (état au 31.12.2009)

Canton de domicile	Tests VIH positifs ^a				Cas de sida		
	Declarations depuis 1985	Declarations des 12 derniers mois	Declarations depuis 1985	Declarations des 12 derniers mois	Declarations depuis 1985	Declarations des 12 derniers mois	
	Nombre de tests positifs	Nombre de tests positifs	Nombre de déclarations	Nombre de déclarations	Declarations par 100 000 ^b	Nombre de cas	
AG	601	30	5.1	945	9	1.5	266
AI	11	2	12.9	6	0	0.0	4
AR	120	0	0.0	17	0	0.0	18
BE	2909	58	6.0	922	16	1.7	660
BL	457	16	5.5	226	1	0.4	152
BS	1257	22	11.8	507	12	6.4	364
FR	676	14	5.2	141	5	1.9	100
GE	4451	66	14.8	1071	24	5.4	706
GL	76	1	2.6	39	0	0.0	32
GR	332	8	4.2	102	2	1.1	76
JU	175	3	4.3	66	1	1.5	57
LU	570	12	3.3	190	9	2.5	141
NE	420	5	2.9	139	2	1.2	92
NW	33	1	2.5	11	1	2.5	11
OW	11	0	0.0	11	0	0.0	10
SG	1027	14	3.0	311	6	1.9	182
SH	136	8	10.6	44	1	1.4	36
SO	526	19	7.5	176	3	1.3	134
SZ	162	5	3.5	71	1	0.6	41
TG	364	9	3.7	121	3	1.3	86
TI	1091	21	6.3	416	6	1.8	205
UR	17	0	0.0	9	0	0.0	7
VD	3063	91	13.2	988	19	2.8	654
VS	574	16	5.3	165	2	0.7	118
ZH	162	4	3.6	71	3	0.6	61
ZH	9590	187	14.0	2556	54	4.0	2061
À l'étranger	488	3	-	136	1	-	74

Over 7400 new HIV infections a day in 2008

- More than **97%** are in low- and middle-income countries
- About 1200 are in children under 15 years of age
- About 6200 are in adults aged 15 years and older, of whom:
 - almost **48%** are among women
 - about **40%** are among young people (15–24)



Définition et principes directeurs du VCT = Voluntary Counselling and Testing

(Conseil et dépistage éclairés du VIH)

- ✓ **Le service est volontaire.**
- ✓ **Le consentement doit être éclairé.**
- ✓ **La confidentialité est de rigueur.**
- ✓ **L'assistance –conseil doit être de qualité.**
- ✓ **La référence est à faire dans le respect des normes.**



Pourquoi faire du VCT en Suisse ?

- ✓ 300'000 tests HIV sont réalisés / année, mais populations les plus à risque ne sont pas toujours touchées
- ✓ 41% des adultes entre 18 et 45 ans ont eu au moins 1 test HIV
- ✓ 99.7% des tests faits dans les Centres de tests anonymes sont négatifs
- ✓ 48% des tests + ont été réalisés dans les cabinets médicaux
- ✓ 44% des homosexuels qui ont fait un test en 2002 n'ont bénéficié d'aucun conseil, ni avant ni après le test

D'un point de vue juridique :

- ✓ Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)
 - Article 22 « toute personne a droit à la sécurité sociale »
 - Article 25 « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être »
- ✓ Convention internationale sur la protection des travailleurs migrants (1990)
 - Article 28 : garantie du droit à la santé
 - Mais pas entrée en vigueur car ratifiée par slt 19 pays
- ✓ L'accès aux soins des illégaux dépend du système de santé du pays d'accueil

Questions éthiques sous-jacentes,

- Que faire des requérants qui seraient dépistés « simples séropositifs » ?
- On veut améliorer la connaissance HIV des demandeurs d'asile au moment où leur nombre diminue, par contre on ne fait « rien » (de spécifique) pour les illégaux, les NEM, etc... : « instrumentalisation » politique du projet ?
- Comment garantir que les résultats ne soient pas utilisés à des fins politiques?

Informier et proposer systématiquement un test VIH aux demandeurs d'asile genevois


Contexte

- 20-40 nouvelles personnes/mois à GE.
- origines géographiques: Afrique : 55%, Europe centrale et Est: 30%, divers : 25%

Objectif


- Offrir *de façon systématique*, des conseils de prévention VIH adaptés au niveau socio-éducatif et au contexte culturel, au cours d'un entretien infirmier individuel.
- Proposer de pratiquer un test rapide de dépistage HIV .
- Si la personne accepte le test, s'assurer de la bonne compréhension de son résultat
- L'orienter ensuite vers le suivi médical le plus adapté.
- Évaluer l'acceptabilité de l'information systématique et la proposition de test.

Pour le public cible « migrants » :
On manque de matériel adéquat
Ce qui existe actuellement n'est pas toujours adapté au niveau d'éducation et au niveau culturel des « clients »



- Un entretien de prévention du VIH individuel et confidentiel centré sur le client, ses connaissances, adapté à sa culture et à son niveau socio-éducatif.
- Un entretien, franc et direct, abordant sans détours les comportements sexuels ainsi que les comportements à risques liés au VIH.
- Un message de prévention actuel adapté à la population migrante

Le VCT est un processus





ABBOTT DETERMINE™ HIV-1/2 Service clients: ☎ 041-788 44 22

Procédure d'analyse pour échantillons de sang total

- 1 Enlever la protection plastique
- 2 Distribuer 50µl de sang total
- 3 Après distribution avec la pipette, attendre une minute
- 4 Distribuer une goutte de tampon de fixation (Maximum 2 gouttes)
- 5 Attendre 15 minutes
- 6 Lire le résultat
Interprétation voir guide d'interprétation

Zône de dépôt


ABBOTT AG
Diagnostics Division
High Wycombe, UK
©141 Bior




Entrée en matière :

QUESTIONNAIRE = fil conducteur


montrez-moi sur cette carte de quel pays vous venez




La prévalence du VIH / sida dans votre pays est de









4. INVESTIGATION DES CAUSES, DES RAISONS ET DES FACTEURS FAVORISANT LA PRISE DE RISQUES.



5. PROPOSITION DE REALISER LE TEST HIV
(explication du délai des 3 mois)
CONSENTEMENT **ECLAIRE** (ORAL)





CLIENT	PROFESSIONNEL
✓ Hétérogénéité des origines	✓ Capacité d'adaptation
✓ Hétérogénéité des connaissances	✓ Constante remise en question
✓ Vulnérabilité psychologique	✓ Vérifier compréhension
✓ Résilience	✓ Triologue avec interprète
✓ Peu de soutien familial	✓ Comprendre sans juger
✓ Stigmatisation du statut VIH	✓ Empathie mais distance
✓ Incertitude quant à l'avenir	✓ Soutenir / relayer auprès du réseau
✓ Promiscuité, manque de confidentialité	✓ Accepter
	✓ Éthique

In the world more than 38 million people are infected with the virus causing aids and 2,8 million people die of aids each year.

In Geneva one person in 100 is infected by the virus causing aids.

- How is aids transmitted?
- How can you protect yourself from aids?
- Should you do a screening test?

Information on HIV/aids for migrant people

- counselling and information about aids/HIV with interpreter if needed
- condoms
- confidential HIV testing (rapid test, result in 15 minutes)

For more information
Contact Denise Wetzel, nurse at the
Centre santé migrants
Tel 022 382 33 33

- confidential consultations
- with or without appointment
- tuesdays and thursdays from 10 to 17h.