

OPIOIDES: DOSES EQUIANALGESIQUES APPROXIMATIVES

Ces posologies analgésiques sont données à titre indicatif et doivent toujours être adaptées à la réponse individuelle ; elles correspondent en général à un début de traitement et doivent être modulées selon les pathologies associées (âge avancé, affections hépatiques et rénales en particulier). Lors de traitement prolongé, le phénomène de tolérance doit également être pris en considération.

posologie journalière par voie orale

	1er jour	ensuite	max / j *
morphine	6 x 10 mg	6 x 10 mg	
buprénorphine sl	3 x 0.2 mg	3 x 0.2 mg.	4 mg
méthadone **	4 x 5 mg	3 x 5 mg	100 mg
tramadol	4 x 50 mg	3 x 100 mg	600 mg
hydromorphone	6 x 1.5 mg	6 x 1.5 mg	

dose unique en administration im, sc ou iv

morphine	10 mg
buprénorphine	0,3 mg
fentanyl	0,05-0,1 mg
héroïne	5 mg
nalbuphine	10 mg
péthidine	100 mg
méthadone	10 mg
tramadol	100 mg
hydromorphone	1.5 mg

* En thérapeutique antalgique

** Lors de traitement oral au long cours, 100 mg de **morphine** correspondent à environ 10 mg de **méthadone**.

Source : Centre multidisciplinaire d'évaluation
et de traitement de la douleur
Pharmacologie clinique, Hôpital Cantonal
Juillet 2003

<http://www.pharmacoclin.ch/>